# 中國醫學界之驚人消息

## 長壽報第三年之偉大犧牲

不論本埠外埠新老定戶 凡預定第三年全年一份者

自一百零一期起至一百五十期止

報費分文不取。祇收寄費五角

此種偉大犧牲。敢稱空前絕後

欲知 過去二年之信用如何？

過去二年之成績如何？

▼請問一萬四千餘位之老定戶▲

因為 事實最雄辯。用不到自己吹牛。

有口已皆碑。何必借廣告宣傳。

謂余不信——請看第三年之長壽報

對於種種改良。均可使君稱心滿意。

注意 未定者請即定閱 已定者請為介紹

日期 自民國廿三年三月十六日起至四月十六日止外埠以郵戳為憑過期仍收二元恕不通融

凡在優待期中。欲補全以前存報者。每年祇收大洋五角。（寄費另加一角五分）無論第一年（即第一期至五十期）或第二年（五十一期至一百期）均可照辦。惟存報不多。欲補從速。幸勿交臂失之。

上海長壽週刊社啓





幸福書局出版醫藥新書

地址上海三馬路雲南路轉角

婦女病 全書二冊 實售一元 外埠函購寄費一角

求孕與避孕 全書二冊 實售一元 外埠函購寄費一角

腎病研究 全書二冊 實售一元 外埠函購寄費一角

百病秘方 全書一冊 實售四角 外埠函購寄費九分

保腦新書 全書一冊 實售四角 外埠函購寄費九分

胎產問題 全書一冊 實售四角 外埠函購寄費九分




# 長壽

于右任


中華郵政特准掛號認為新聞紙類

每份四分 第九十六期

中華民國二十三年四月六日

每逢星期五出版 全年五十期連郵二元 國外加倍

館址上海三馬路雲南路口幸福書局內

◉內政部登記證警字第一一二七號◉

◉本報特聘請 吳之屏 方家楨 大律師為常年法律顧問◉


本期目錄


□卷頭語
天花與種痘
□性的常識
色慾之害
淋病之研究
□胎產常識
胎教之注意
談談婦女懷孕之徵狀
□實用驗方
救自刎斷喉秘法
急救縊死
急救溺死壓斃秘方
急救凍死秘方
□育兒常識
兒科須知
小兒睛珠變質之原因
□藥物研究
鹿茸麂茸出產辨
貝母之研究
□長篇專著
癆疾自療法
□用藥指南
龍胆草藥性之淺解


## 天花與種痘

龐敦敏

我們不幸而生在這齷齪世界。常常有許多病魔來侵犯我們。今天很健康的一個人。明天也許就病了。病的種類是很多很多。我現在要講一種很可怕的病症。叫作天花。或叫痘瘡。天花這個病症。是從古以來就有的。有人說的發源地是印度。慢慢的傳到中國。他究竟怎樣的起原。怎樣的傳播。我們現時暫且不去考究他。我要把天花的病狀來說一說。明朝有一個小兒科的醫生。叫作朱應我。很精於治痘。著的一部摘星樓治痘全書上。把痘症（就是天花）當作小兒之人鬼關。可見這病是很可怕。很危險的。照現今有實驗有證明的新醫學說起來。這天花的的確是一種傳染病。不但是病人身上掉下來的痂皮。有傳染力。就是病人身旁的器具衣服。也有傳染力的。我們用顯微鏡檢查。雖然看不見什麼。但是我們確實知道有一種很小的東西。是這個病的根源。不過現在的顯微鏡。還不很好。我們的技術。還不精。沒有法子看見他罷了。古時候的醫生。以痘為胎毒。實在靠不住。那些鄉下老婆子說。是有一位痘神娘娘作怪。自然更不可信了。天花的病毒。就是我剛纔所說的很小很小用顯微鏡也看不見的那件東西。飛到那人的呼吸器裏面。或是皮膚破碎的地方。那人就要出天花。卻並不是今天染毒。今天就出的。少則十天。遲則半個月之後。先發熱。頭痛。腰痠。氣急。身上發出紅斑來。在這時候。那是往往要當作出疹子。過了一二天。那紅斑退了。先從臉上起。漸漸的到下身。（未完）

# 性的常識

## 色慾之害

（陳富文）

書曰。飲食男女。人之大欲存焉。色慾之事。人好之不爲過。豈知色過度。則必身體衰弱。皮白如蠟。縮而皺痕。眼則深入。唇則藍白。鼻尖而冷。指甲發白。身體不煖。脈小無力。胃不消化。目暈眼花。此皆色慾過度之病狀也。至於宿娼嫖妓。害尤滋大。蓋娼妓多患梅毒。與之接近。或患下疳。或患白濁。甚有患梅毒。害及本身。更害及其妻孥。以之絕嗣者。佛家言。色慾猶魔障也。又古人戒淫詩云。二八佳人體似酥。腰間挂劍斬愚夫。雖然不見人頭落。暗裏催君骨髓枯。即色慾過度。並宿娼之害之謂也。是以研究衛生者。此當戒除者也。


妓不孕

每册四角　寄費九分

上海幸福書局代售


## 淋病之研究（續）

濤譯

淋病的根本治療：所謂淋疾是一種具有非常頑固性質底病。若一旦受傳染是處不易治療的。所以無論如何預防是非常的必要。在日本政府有發表花柳病的法案。如果患此病而傳染給旁人的時候。要受有極重底刑罰。對于預防是非常底努力。可是于實際預防上——每人衛生思想促進的方法還沒有。

家庭中之婦人患淋疾的結果。不用說是由于男人品行惡劣底結果所引起的。所謂這些都是一般男人從某種地方得來的病症。同時瞞着自己的妻去密的治療。然而此種病並不是一朝一夕可以治愈的。所以終于對于妻子傳染底機會是很多。

到了最後。男人纔向自己的妻子說明。同時妻亦只好寬容。于是彼此的病症成了非治不可的樣子了。

如果不幸得了這種病的時候。切不可用暫時平常人的自療法。必須要急速請專門醫生用高妙底方法治療

這種病症多是時期與病症權應。因爲治療的方法很難。所以平常人的自療法都是很危險的。

淋菌初期侵害之徵候

淋菌侵入到膣內與尿道的時候。這便是初期症狀之異點。

淋菌最初侵害膣內的時候。便起一種膣加答兒。及頸管加答兒等。立刻便釀出一種膿樣底帶下。同時這種帶下中常常是混有血液的情形。這便是淋菌已經侵蝕而且入到頸管部中。在這個地方便起了激烈底加答兒。並且還要糜爛的。

同時于下腹部。腰部及薦骨部還有一種不快底感覺。或是覺得腹中脹。或是下腹部有一種攣急底疼痛。

其次便是淋菌侵入到尿道時候。俗謂之消渴。尿道之口發腫。同時小便時還覺得疼痛而且艱難。

除去此種情形之外。膣之入口的兩側。尚有名叫貝爾托林氏腺（前庭大腺）的小毛穴。淋菌也有從此侵入的。到了這時便起一種可謂貝爾托林氏炎。再經過異常疼痛。遂到了破裂出膿的時候

男子患淋疾對于女人妊娠之胎兒之障礙？

黴毒對于胎兒有直接影響。而淋疾並無直接影響。

然而男人若患淋疾。當然對于妻的傳染不能不留心。若患淋病而同時又妊娠。那便非慎重地調護不成。妊婦的淋疾是一件非常重大的事情。如產後患最可怕底產褥熱。多是因于淋菌的緣故。所以分娩時如有此疾必需要向接生婦說明。還有產後子宮收縮時。關于清潔內部需要十二分底注意。同時切要細心預防淋菌從子宮侵入到喇叭管及腸膜內。

對于生下來的小孩。生後即用苦列—地氏的硝酸銀點眼法。若不注意乳兒的眼睛而淋菌侵入。便起一種膿漏眼（俗謂之風眼）以致可以失明。硝酸銀點眼法。直到今日爲一般人所應用。然而仍有失明底不幸底孩子。所以對于它的注意是十分必要的。

（完）


上海新新公司常年醫藥顧問　朱振聲醫士　上海世界書局常年醫藥顧問

## 診例

（甲）門診一元
（乙）出診四元
（丙）膏丸方四元
（丁）外埠問病二元
（戊）急病隨請隨到

號金不取　路遠遞加　隔日取件　原班回件

時間　門診上午九時至下午四時止　出診四時以後

診所　上海雲南路會樂里第一弄第一家

電話　九一四九二

掛號處啓






# 胎產常識

## 胎教之注意

魏鏡清

△人之生也。稟受父母之形骸氣質。是爲先天。故人形骸氣質之美惡。已定於有生之初。夫父母愛子之心。無所不至。疾病饑渴。則憂之憐之。雖愚昧之人。亦不願生敗子。然而市井無賴。觸目皆是何哉？則胎教之不講求故也。胎教之方法維何？即下述是己；

△禁慾念　女子一覺有孕。即宜別寢。否則亦須禁絕房事。蓋慾念一動。往往有墮胎難產等事。且此好淫之性。早已遺傳於胎兒。將來爲害於子女者極大。願世之爲父母者。注意之。

△高尚其品性　女子無知。往往喜聽里巷猥褻之談。爲夫者當將古來英雄豪傑之事。每日講若干則。或令其觀往哲之遺像。及正當之小說。或與之游山川花木之地。務使優遊漸漬。常存一高尚之感覺。則品性自無形而高尚。而子女之品性。亦隨母念而推移矣。

△開發其性情　女子多愁。一不滿意。則哭泣隨之。鬱悶之懷。平時且極不宜。況有孕之時乎？故爲夫者。當和善其形貌。溫柔其言語。融融洩洩。毋使勃谿。使婦女心中。常覺怡悅。則有益於胎者極大矣。

總之。女子一有孕。其一動一靜。與胎中皆息息相關。欲使子女爲善。當先講求胎教。昔太任之孕也。目不視惡色。耳不聽惡聲。口不出惡言。爰生文王。日本名儒伊滕仁齋妻懷孕時。仁齋每每晚爲誦述孝經詩書。生子東涯。知名於世。是二者。皆胎教之效也。

## 談談婦女懷孕之徵狀

（朱鄉棨）

說起這女人有沒有胎這問題。時常要使吾們醫學家煩惱。因爲法庭上時常受理這類案件。而法官難以自斷的時候。必須委託醫師代爲鑑定。而我們的鑑定。又必須依據受驗女子身體生理的變狀而下斷言。絕不能用推測理想之詞以塞責。所以對於懷孕時候的徵狀。是很值得研究的。至於成爲法醫問題之原因。其緣由不外下述幾點；

A 婦女自稱有胎。以便向她的正夫或誘夫。詐索巨貲。

B 託詞懷孕。以避去法庭之傳訊。

C 女子自認腹內有胎。將產生一合法的承續遺產人。爲着使遺產問題爭執勝利。

D 託詞有胎。藉可延遲極刑的執行時間。

F 假借懷孕之名義。以圖破壞閨女或寡婦之名譽。

F 控告醫師誤診有孕。或意圖非法之墮胎。

G 珠胎早結。因欲顧全體面及生計。而行墮胎或殺胎行爲。被人發覺而涉訟的。

上面既已將原因說明了。現在再把懷孕的未確徵狀。分爲六段。詳論如下！

（一）月經停止　女子的月經。若素來正常規則。一旦停止。滿三個月不來潮。身體康健如常。那就是懷孕之證。因爲若是病。則有相當病狀發現。但也有身雖懷孕而經來如常。或素無月經而身卻懷孕。甚有因了懷孕而行經。在平時卻反停經。不過這都是例外。醫家很少遇見。

（鄉棨註）三年前嘗見一女子。因懷孕而守秘密。按月裝作假行經。借用其長姊之經布代替之。如不留神。不易窺破。這點不可不注意啊。

（二）早晨嘔吐　晨起嘔吐。最易發見於懷孕的初期。（一月左右）普通發後即止。亦有纏綿不休。而成全部孕期的痛楚的。但應知有即孕期將滿而不一吐的。或並沒有胎。因病而吐的。時有所見。所以晨吐這問題。斷乎不能引爲懷孕之確證。

（鄉棨註）我在海事供職時。嘗見某醫診一青年寡婦。誤急性胃炎爲孕吐。開飽嘗熊掌一頓寢事。豈不笑話。

（未完）

## 實用驗方

### □救自刎斷喉秘法(佚名)

自刎者。乃迅速之變。須救在早。遲則額冷氣絕。初刎時。氣未絕。身未冷。急用絲線縫合刀口。摻上桃花散。多摻爲要。即以棉紙四五層。蓋刀口藥上。以舊布周圍繞五六轉紮之。將自刎者仰臥高枕。枕在腦後。使項鬱而不直。刀口不開。冬夏避風。待口鼻中有氣通出。以薑五片。人參一錢五分。用米一合。煎稀粥湯。隨便食之。接補元氣。三日後。急解去前藥。仍須摻上桃花散。纏札二日。後再用濃葱湯。軟絹蘸洗傷處。泡乾。用玉紅膏摻塗傷口。長四寸闊二寸之布。將玉紅膏塗布。如膏藥之狀。黏連好肉。庶不脫落。外用絹條圍繞三轉。自能生肌長肉收功。如大便結燥。不可用利藥爲要。按此方雙嗓皆斷者。百日。單嗓斷者四十日必收功。

(桃花散方)

石灰半升。大黃一兩五錢。切片。將二味同炒。至石灰變紅色爲度。去大黃。篩極細末。

(玉紅膏)

甘草五分。生地四兩。全當歸三兩。象皮二兩。沒藥一兩。乳香二兩。合歡皮二兩。右藥用麻油一觔半。煎枯。去渣。再入黃占四兩。白占二兩。血竭五錢。煎至滴水不化。成膏備用。

### □急救縊死(全上)

凡男婦縊死。雖僵。若胸口溫者。可救。老年之人。在六小時內可救。但切不可割斷繩索。緩緩將縊人抱起。解散。將縊人安平坦之處。仰面朝天。頭要扶正。先將大小便口之處。用棉花塞緊。如男可用棉花。將小便包緊。不令泄氣。然後將手足慢慢屈伸。用一人坐於頭前。兩脚踏其肩。揪住頭髮。再用兩人。將細竹管入耳內。不住吹氣。不可住手。揉其胸。再用一人口對口輕輕呼吸。令喉項順通。其氣少頃即從鼻中而出。然後將大小便軟物軸出。甦醒後。將官桂湯及稀粥湯頻頻進。令順咽喉。切不可用茶水灌。照法醫救。百無一失。

(官桂湯)

製半夏一錢。厚朴一錢。官桂五分。乾薑五分。廣皮八分。生甘草三分。水煎服。再宜啗通關散。

### □又方(全上)

如前法放下。急用活雞冠血滴喉鼻中。男左女右立甦。男用公雞。女用母雞。

### □急救溺死屢驗秘方

凡救溺死。急開其口。橫銜一箸。使水得出。屈兩足。使有力者。肩上。背對背。倒馱而行。令吐出水。仍取燥土或灶中乾灰。須稻草灰更佳。鋪地。將溺者臥於上。再以乾灰蓋上。露口眼。使水收入土中灰中。令活人口對口接氣。漸能甦醒。此法雖身僵氣絕。亦能救活。但口開腹不飽者。雖救亦不可復活。

又法開口橫箸。以細竹管。吹其兩耳。以生半夏末吹入鼻中。以皂角末置竹管上。吹入糞門。用鑊覆地。以溺者之臍對鑊臍俯臥。令用人將兩足提高。待水從口中流出。用薑汁灌之。令人接氣即活。

凡冬月溺死者更快。但胸前微有溫者可救。或見微笑。急掩其口。不掩則不救爲要。凡溺死凍死者。切忌火烘。致逼寒入內。皆不救。

### □急救凍死秘方(全上)

凡救凍死者。急以活人煖衣裹好。再以米炒熱。絹包。熨其心胸。冷則再換。俟其稍有回生之色。以淡薑湯灌之即活。或再不甦。用雄黃焰硝各等分爲末。點兩眼角。立甦。如見微笑。急掩其口鼻。否則不救。若誤將熱湯灌之必死。若遽近火即死。




**辛福書局代售各種良藥**

地址上海三馬路雲南路轉角

**遺精散**
有夢而遺 無夢而洩 久思新起 服之如神
每盒大洋一元

**保腦丸**
用腦過度 鼻流濁涕 腥臭異常 一服即愈
每盒大洋五角

**白濁丸**
白濁初起 溺管刺痛 止濁定痛 效如桴鼓
每盒大洋一元

**吐血靈丹**
肝火犯肺 肺絡損傷 痰紅吐血 服之立止
每盒大洋五角

**獺肝定痛散**
女子善鬱 肝病時發 獺肝定痛 靈驗無比
每盒大洋四角




## 長篇專著

### □瘧疾自療法(十九) 朱振聲

□治瘧單方

(一)老瘧不愈。取肥大牛膝一握。剉。酒水相半煎服。

(二)痰瘧。半夏一兩。煎湯和姜汁煎服。

(三)白葵花。陰乾。擣爲末。酒調服治日日瘧。

(四)夜明砂(即蝙蝠屎)擣爲末。每取一錢。冷茶調下。治五種瘧疾。

(五)治瘧用小蒜研極爛。和黃丹作丸。梧子大。每七丸。桃柳枝煎湯吞下。名脾寒丹。

(六)鱉甲主治溫瘧老瘧。用甲炙爲末。每二錢。溫酒調下。連三服無不斷。

(七)不論日日瘧。間日瘧。用大荸薺。將好燒酒。自春浸至秋時。如瘧至。不食飲食。食則脹滿不下。每日服荸薺兩三個。三日即愈。

(八)久瘧不止。蒼耳子酒糊丸服。

(九)五臟氣虛。痰飲結聚發瘧。附子同紅棗葱姜水煎服。

(十)瘧疾。取生姜汁露一夜服。孕婦發瘧尤妙。

(十一)常山截瘧甚效。凡瘧多痰水。非此不能。

(十二)瘧疾。多敗血痰水。當下而下之不盡者。再下之。大黃與常山煎服。

(十三)截瘧法胡椒。雄精。右二味。等分研末。將飯研爛。爲丸。如桐子大。外以硃砂爲衣。將一丸放在臍中。外以膏藥貼上。瘧即止。此法親自試過。甚驗。

(十四)三陰大瘧。用活大烏龜一個。連殼左右肩上。各攢一孔。近尾處亦攢一孔。以明雄黃九錢。研細每孔摻入三錢。外以黃泥包固。勿令泄氣。炭火煨存性。研細。每服一錢。空心陳酒下。二三服即止。

(十五)瘧至腹痛。用巴豆仁一粒。搗爛不去油。先瘧前二時。置椎骨第一節。外以小膏藥蓋之。過瘧發之期則揭去。此法用之小兒。並無所苦。且有奇效。

(十六)瘧疾不愈。用砒霜一錢。菉豆粉一兩。以麵糊和丸。如菉豆大。每服五丸至七丸。一次即愈。重者再服。無不瘳者。惟愈後宜忌米飲。

按砒石燥痰(丹溪云無濕不成痰。無痰不成瘧。故治瘧者當袪痰。)截瘧諸家本草。原有明文。惟性熱而毒。故佐以十倍之菉豆。甘寒解毒。每服又祇五至七丸。自無中毒之虞。考瘧之病源。以麻拉利亞原虫。侵入血液。孳乳爲害。惟砒能殄滅之。此丸以砒爲主。猶西醫注射六〇六也。揆諸病理。既無扞格。施之臨牀。自顯殊功。

(十七)截瘧方用常山三錢。烏梅鱉甲(分量約畧)紅棗三枚。生姜三片。甜茶廿文。未發前一時飲服。三服見痊。身弱者忌。勿妄服之。

(十八)患三陰瘧者。頗難治愈。可用明白凡一錢。侖生一錢。腰黃一錢。白信三厘。共研細末。爛飯爲丸。如梧桐子大。每服六丸。濃茶湯送下。濕重者吐去濃痰。即愈。

## 用藥指南 朱振聲

(六十二)龍胆草(苦澁大寒入於肝胆)

□主肝胆熱邪 肝木胆火。化熱邪於內。則成內熱。龍胆草入肝胆二經。苦寒能遏熱邪也。

□清下焦濕火 濕火相鬱則成毒。即下焦楊梅瘡等是也。龍胆草苦寒。長於去濕熱。敗毒大有奇功。

□腸中小蟲蠱脹 大小腸有濕熱相爭。則化虫。虫積久則成蠱。虫得苦則安。得酸則軟。龍胆艸苦澁能去濕熱。安虫下虫也。瘧腫腸證。由於濕熱成毒而生。龍胆艸苦寒。能化濕熱敗毒。故可治之。

□嬰兒客忤驚癎 客忤驚。因小兒胆小。見人則駭。由駭而起發熱。熱極生風。肝風動矣。筋乃抽縮無定。龍胆草苦寒。入於肝胆。善瀉肝胆之熱。熱退則風去而驚除。嬰兒疳積。由飲食不節。生冷失宜。濕熱困脾。脾不運化。則肌肉削瘦。肚腹獨大。龍胆艸苦寒。能化濕熱。濕熱去。腹大愈。肌肉長矣。

# 育兒常識

## 兒科須知(續)

(姚心源)

第十方 治小兒大便秘結。驚悸。

第十一方 治小兒肺閉。肝厥。 麻油調保赤散

第十二方 治小兒既吐又利。 石菖蒲 石決明 鈎藤 保金丸(痰多用回春丹)

玉樞丹(半吞下半納臍中)

第十四方 治腦膜炎。 葛根 黃連 鳳尾艸 蚤休

第十五方 治小兒涕不得通。 鬧羊花 細辛 麻黃 牙皂 細末取涕

第十六方 治小兒痢疾。 紅白扁豆花 紅白糖 白頭翁 秦皮

第十七方 治小兒瘧疾。 檳榔 煨大棗 姜 冰糖

第十八方 治小兒疳積勞病 牛膝炭 萊菔英 梧桐子 烏梅

第十九方 治小兒骨蒸熱。 綠萼梅 薔薇瓣

第廿方 治小兒暑熱欬嗽。 竹葉 蘭艸

第念一方 治小兒腕悶煩熱。 連翹 荷梗 白燈薪

以上念一方。悉本家傳。標以出之。惟世之博雅君子垂敎焉。

## 小兒睛珠變質之原因

(傅步蘭)

世有兩目視物不清。漸至恍恍。僅見人物若一黑影。不能分辨頭面。而瞳人亦變成睛白質若毛玻璃骨類之色。日久瞳人漸變闊大。狀若黃豆大小。色亦由睛白質變爲透明色。終變成黃色。至此雖晝夜不能分辨。是之謂睛珠變質。其病症原因。則由於梅毒。據醫士攷察。大概兒童自四歲至二十歲。患此症者。居百分之九十。爲由父母遺傳。而百分之十。則由痧症與由外界傳染之梅毒。如身患梅症之人與小兒親吻。及小兒用其茶杯手巾之屬。皆足爲傳染之媒介。治法。初現時用碳碘溶爲淡水。按時內服。淸血驅毒。毒盡目便保全。不致損壞。是以身體健壯。與未患惡疾之父母。對於子女固當謹愼防護。免致外界之傳染。卽或不幸。子女因於遺傳與由外界傳染。致發現此種病症。理應延醫療治。豈可因其不道德之惡症。思顧一時之體面。坐成憒事？故在醫士方面。對於此種情節最爲痛恨。著書立說。苦口力勸。費盡心機。卒無補救。亦徒扼腕太息耳！而僕於此。亦望吾人勿務虛名。庶求實理。故不憚詳爲敘說。俾知病症危險。從事求醫。不致誤事。設得人能盡明實理。不爲陋俗所惑。既知防範之法。復肯延醫療治。則十年之後。中國瞽人之減少。自無限量矣。

按楊梅症傳染之媒介。以茶杯面巾二者爲最多數。上海素號文明之區。其商市之佈置。多爲內地鎭市所傚法。卽茶室酒樓佈設整潔。外觀頗雅。然一究其實際。則杯箸面巾之屬。皆不甚潔淨。其畧知講究者。則僅用肥皂滌洗面巾。使之潔白。以求觀瞻。而不能眞實事求是。將各巾放於沸水中煮之也。況每日食客擦面。其巾由甲而乙。則祇於熱水中一蘸浸之。事之危險。固莫若此。甚望其有起而改良之。茶杯不潔之害。據美醫士某君言，凡公共所用之茶杯。多不潔淨。吾人設以顯微鏡察視杯緣。則可見層層唇皮微穉蝸居。苟患有惡疾之人。所用之杯轉而飲之乙。則甲之毒卽由是杯傳遞入乙之口。而乙感受其毒。遂懨懨病矣。楊梅傳染之能力及其危險若此。而華人輒處之若素。豈非習慣所成？然苟一證明其理。則又未有不惕然知懼者。且潔身自好之人。一旦驟由傳染而得斯症。則人必以爲花柳所致。豈肯盡信其由於杯巾傳染之故？是以潔身自好之人。對於防範楊梅。尤當嚴密也。



# 問病須知

(一)本報醫藥顧問欄。近因問病函件。積壘如山。全人等雖日夜答覆。一時實難清理。對於以後問病函件。不得不另訂新章。以示限制。

(二)今後如定戶欲問病者。本埠須附郵五角。外埠一元。以示限制。空函恕不答覆。非定戶本埠一元。外埠二元。問病者須詳述「男女性別」「何時起病」「經過治療」「現在症狀」方能處方答覆。而不致有誤也。

(三)凡定戶來函問病時。除照章納費外。並須寫明定單號碼。否則。作非定戶論。



# 藥物研究

## 鹿茸麋茸出產辨(續)

何心餘

(十二)仰光之茸。身瘦長。毛黃。粗皮。烏黃色。頂少尖者多結血頂。盤下大過盤面三分之一。肉色淡黃。皮薄味微鹹。切開皮肉。脫而不相連者。亦有。

(十三)西川所產之茸。毛幼而黃。身瘦。附枝甚長。頂角帶青。盤面卽開叉。多連頂角。肉色同北麋。味淡皮色微黃。帶烏。

(十四)坤甸之茸。皮黑而薄。毛烏黃而少。身直肉色土白味鹹。紋深且長。血者亦有。少而不多。實勝越山口洋沒里洞等處所產。身皮毛色。皆不相上下。所差無幾。總之南洋各地所產之茸。身直無彎。皮色老而有光紋。深盤大珠點凸起。身光少毛。身小短重至斤者絕少。卽有亦老不堪用矣。

(十五)高低。吧實。宋卡。大年。六坤。萬那。老蒲。那老勿。各埠。概深水地所產之茸。身長者尺五六。至二尺者亦百無一二。皮色如烏棗毛。烏中帶些白黃。盡皆連盤漸落。並無單取茸尾者。身材同坤甸等處所產相仿。認眞此道者。甚難分別。惟深水地之茸。味淡而氣者。因此多蛀。不能貯久。其血頂如還茸。所有南洋之茸。血頂皆同(完)

## 貝母之研究(續)

(沈仲圭)

用量 二錢至三錢

禁忌 濕痰 風痰 寒痰

長反 和厚朴白薇配合。反秦艽桃花烏頭。

驗方 1.化痰降氣——川貝去心一兩。姜製厚朴半兩。蜜丸。梧子大。每白湯下五十丸。

2.吐血不止 衄血不止。貝母炮研。溫水送服二錢。

3.便癰腫痛 貝母白芷等分爲末。酒調服。或酒煎服。以渣貼之。

4.寒實結胸 桔梗 貝母各七錢半 巴豆二錢五分。右三味。爲散。納巴豆。更於血中杵之。以白飲和服。強人服三分。羸者減之。

編者考語 貝母爲化痰藥。其化痰之藥理。全在收斂微血管。使支氣管壁之分泌減少。則痰自希。痰希則欬自癒。(咳嗽本爲驅痰外出之救濟作用)惟咳嗽重者。宜用蔴醉劑。非貝母所能勝任矣。貝母之治出血。亦在收斂作用。而近世醫工。多不取用。蓋古義浸失矣。寒實結胸徐靈胎云卽痰飲。痰飲之主證。爲咳嗽吐痰氣喘。雖與結胸不侔。然該方用桔貝以化痰。巴豆以平喘。(按巴豆能使腸部蠕動亢進。分泌加多。引起下部之充血。下部藏器充血。上部血量勢必減少。而神經之感覺力。亦因以遲鈍。喘乃得止。)對於痰飲。確屬相宜。人謂「仲景方審症用之輒效。」觀於此而益信矣。白芷爲麻醉藥。貝母爲化痰藥。二味相合。功能止痛消腫。故永類鈐方用治便癰腫痛也。(完)